

POZNÁMKY K RIEMANNOVEJ VEĽE O DIVERGENTNÝCH RADOCH

TIBOR ŠALÁT, Bratislava

Nech

$$\xi = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots \quad (1)$$

je divergentný rad s kladnými členmi a nech $a_n \rightarrow 0$.

Znamienkovou schémou budeme nazývať postupnosť:

$$[\alpha] = \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n, \dots$$

kde $\varepsilon_n = 1$ alebo -1 pre každé $n = 1, 2, 3, \dots$

O rade:

$$[\alpha] \xi = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \varepsilon_3 a_3 + \dots + \varepsilon_n a_n + \dots \quad (2)$$

budeme hovoriť, že vznikol aplikovaním znamienkovej schémy $[\alpha]$ na rad (1).

Označme znakom X množinu radov (2), vzniknutých aplikovaním všetkých znamienkových schém na rad (1).

Definujme na množine $X \times X$ reálnu funkciu $\varrho(x, y)$ takto: Nech $x, y \in X$,

$$x = [\alpha] \xi = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \varepsilon_3 a_3 + \dots + \varepsilon_n a_n + \dots$$

$$y = [\alpha'] \xi = \varepsilon'_1 a_1 + \varepsilon'_2 a_2 + \varepsilon'_3 a_3 + \dots + \varepsilon'_n a_n + \dots$$

1. Ak $x = y$, potom $\varrho(x, y) = 0$.

2. Ak $x \neq y$, potom $\varrho(x, y) = \frac{1}{\lambda}$, kde λ je prvý index taký, že $\varepsilon_i \neq \varepsilon'_i$. V práci

[1] je dokázané, že takto definovaná funkcia ϱ je metrikou na X .

Definícia 1. a) Nech $x = [\alpha] \xi \in X$. Ak rad x je konvergentný, označme jeho súčet $S(x)$. Ak rad x diverguje $k + \infty$, resp. $-\infty$, položme $S(x) = +\infty$, resp. $-\infty$. Ak rad x osciluje, potom symbol $S(x)$ nedefinujeme.

b) Označme znakom X_1 množinu tých $x \in X$, pre ktoré je $S(x)$ definované, t. j. ktoré majú súčet a znakom X_2 množinu tých $x \in X$, ktoré oscilujú.

c) Nech $x \in X$. Znakom $S'_n(x) = S_n([\alpha] \xi)$ pre n prirodzené budeme značiť n -tý čiastkový súčet radu x .

Poznámka. Na množine X_1 je teda definovaná reálna funkcia $S(x)$. Ďalej zrejme platí: $X_1 \cup X_2 = X$.

Označenie. V ďalšom znakom E_1 budeme značiť množinu všetkých reálnych čísel, znakom E'_1 zase množinu: $E_1 \cup (+\infty) \cup (-\infty)$.

Známu Riemannovu vetu, vzťahujúcu sa na divergentné rady typu (1), možno vysloviť takto:

1. Ke každému $m \in E'_1$ existuje schéma $[\alpha]$ tak, že $S([\alpha] \xi) = m$ (3).
2. Nech $\nu, \mu \in E'_1, \nu < \mu$. Potom existuje schéma $[\alpha]$ tak, že: $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf S_n([\alpha] \xi) = \nu$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup S_n([\alpha] \xi) = \mu$, t. j. rad $x = [\alpha] \xi$ osciluje medzi ν a μ .

Predmetom tejto práce je problém počtu schém $[\alpha]$, ktoré spĺňajú rovnicu (3) pri m konečnom reálnom, položený prof. M. Kösslerom a ďalej vyšetřovanie vlastností priestoru (X_1, ϱ) vnoreného do (X, ϱ) .

Lemma 1. Nech $\xi = \sum_{i=1}^{\infty} a_i, a_i > 0$ pre každé $i = 1, 2, 3, \dots, S(\xi) = +\infty$, $\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = 0$. Potom existujú rastúce postupnosti prirodzených čísel $\{k_n\}_{n=1}^{\infty}, \{k'_n\}_{n=1}^{\infty}$ tak, že:

1. Každé prirodzené číslo padne práve do jednej z postupností $\{k_n\}_{n=1}^{\infty}, \{k'_n\}_{n=1}^{\infty}$.
2. Rady $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}, \sum_{n=1}^{\infty} a_{k'_n}$ divergujú $k + \infty$.

Dôkaz: Nech l_1 je najmenšie prirodzené číslo také, že $\sum_{i=1}^{l_1} a_i > 1$, l_2 najmenšie prirodzené číslo $> l_1$ také, že $\sum_{i=1}^{l_2} a_i > 1$, atď. Keď už máme definované l_n , nech l_{n+1} je najmenšie prirodzené číslo také, že $l_{n+1} > l_n, \sum_{i=l_n+1}^{l_{n+1}} a_i > 1$. Čísla l_k zhladom na predpoklady lemy existujú. Takto dosávame nekonečnú postupnosť:

$$l_1, l_2, l_3, \dots, l_k, \dots$$

Postupnosti:

$$1, 2, \dots, l_1, l_2 + 1, l_2 + 2, \dots, l_3, l_4 + 1, l_4 + 2, \dots, l_5, \dots$$

$$l_1 + 1, l_1 + 2, \dots, l_2, l_3 + 1, l_3 + 2, \dots, l_4, l_5 + 1, l_5 + 2, \dots, l_6, \dots$$

zrejme spĺňajú tvrdenia lemy.

Veta 1: Nech $\xi = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0$ pre každé prirodzené $n, a_n \rightarrow 0, S(\xi) = +\infty$. Nech $m \in E'_1$.

Tvrdenie: Existuje nespočetne mnoho mohutností kontinuálnych znamienkových schém $[\alpha]$ tak, že $S([\alpha] \xi) = m$.

Dôkaz: Podľa predložej lemy zostrojme rady:

$$\xi_1 = a_{k_1} + a_{k_2} + a_{k_3} + \dots + a_{k_n} + \dots \quad (4)$$

$$\xi_2 = a_{k'_1} + a_{k'_2} + a_{k'_3} + \dots + a_{k'_n} + \dots \quad (5)$$

Utvorme množinu $X', (X'')$ všetkých hrádov $[\alpha] \xi_1, [\alpha] \xi_2$; vzniknutých aplikovaním všetkých možných schém $[\alpha]$ na rad ξ_1, ξ_2 . Podľa dokázanej lemy $S(\xi_1) = S(\xi_2) = \infty$. Znakom $S'_n([\alpha] \xi_1)$, resp. $S'_n([\alpha] \xi_2)$, budeme rozumieť n -tý

čiasťočný súčet radu $[\alpha] \xi_1$, resp. $[\alpha] \xi_2$. Aplikujeme teraz Riemannovu vetu na rady (4), (5). Existujú teda schémy $[\alpha_1]$, $[\alpha_2]$,

$$[\alpha_1] \equiv \epsilon_{k_1}^{(1)}, \epsilon_{k_2}^{(1)}, \epsilon_{k_3}^{(1)}, \dots, \epsilon_{k_n}^{(1)}, \dots$$

$$[\alpha_2] \equiv \epsilon_{k_1}^{(2)}, \epsilon_{k_2}^{(2)}, \epsilon_{k_3}^{(2)}, \dots, \epsilon_{k_n}^{(2)}, \dots$$

takže

$$S([\alpha_1] \xi_1) = \frac{1}{2} m + a, \quad S([\alpha_2] \xi_2) = \frac{1}{2} m - a,$$

kde $0 < a < 1$. Sčítaním napísaných rovníc dostaneme:

$$S([\alpha_1] \xi_1) + S([\alpha_2] \xi_2) = m.$$

Ukážeme, že:

$$S([\alpha_1] \xi_1) + S([\alpha_2] \xi_2) = S([\alpha] \xi), \quad (6)$$

kde schéma $[\alpha]$,

$$[\alpha] \equiv r_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \dots, \epsilon_r, \dots$$

je definovaná takto: Ku každému prirodzenému r existuje na základe konštrukcie radov (4), (5) jediné prirodzené n tak, že $r = k_n$, resp. $r = k'_n$. Potom $\epsilon_r = \epsilon_{k_n}^{(1)}$, resp. $\epsilon_r = \epsilon_{k'_n}^{(2)}$. Dokážme teraz platnosť rovnice (6). Nech $S_n([\alpha] \xi)$ je n -tý čiastočný súčet radu $[\alpha] \xi$. Nech (r') je najväčší index taký, že $k_r \leq n$ ($k'_r \leq n$). Potom $S_n([\alpha] \xi) = S_{k_r}([\alpha_1] \xi_1) + S_{k'_r}([\alpha_2] \xi_2) + A$, kde A je buď 0 alebo súčet tvaru:

$$\epsilon_{k_r+1}^{(1)} a_{k_r+1} + \epsilon_{k_r+2}^{(1)} a_{k_r+2} + \dots + \epsilon_{k_r+m}^{(1)} a_{k_r+m},$$

resp. $\epsilon_{k'_r+1}^{(2)} a_{k'_r+1} + \epsilon_{k'_r+2}^{(2)} a_{k'_r+2} + \dots + \epsilon_{k'_r+m}^{(2)} a_{k'_r+m}$. Pre dost veľké r , (r') bude už vzhľadom na konvergenciu radov v (6) podľa Cauchy-Bolzanovho

kritéria: $|A| < \frac{\epsilon}{3}$ a

$$\left| S_{k_r}([\alpha_1] \xi_1) - \left(\frac{1}{2} m + a \right) \right| < \frac{\epsilon}{3}, \quad \left| S_{k'_r}([\alpha_2] \xi_2) - \left(\frac{1}{2} m - a \right) \right| < \frac{\epsilon}{3}, \quad (8),$$

kde ϵ je ľubovoľné kladné číslo. Pre dostatočne veľké n bude aj r , resp. r' také veľké, že nerovnosti (7), (8) budú splnené, takže:

$$\left| S_n([\alpha] \xi) - m \right| \leq \left| S_n([\alpha] \xi) - S_{k_r}([\alpha_1] \xi_1) - S_{k'_r}([\alpha_2] \xi_2) \right| + \left| S_{k_r}([\alpha_1] \xi_1) - \left(\frac{1}{2} m + a \right) \right| + \left| S_{k'_r}([\alpha_2] \xi_2) - \left(\frac{1}{2} m - a \right) \right| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

Teda: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n([\alpha] \xi) = S([\alpha] \xi) = m$.

Zvolme teraz $a' \neq a$, $0 < a' < 1$. Podľa Riemannovej vety existujú schémy

$$[\alpha_3] \equiv \epsilon_{k_1}^{(3)}, \epsilon_{k_2}^{(3)}, \dots, \epsilon_{k_n}^{(3)}, \dots$$

$$[\alpha_4] \equiv \epsilon_{k_1}^{(4)}, \epsilon_{k_2}^{(4)}, \dots, \epsilon_{k_n}^{(4)}, \dots$$

takže

$$S([\alpha_3] \xi_1) = \frac{1}{2} m + a', \quad S([\alpha_4] \xi_2) = \frac{1}{2} m - a'.$$

Podobne ako predtým sa presvedčíme, že $S([\alpha'] \xi) = m$, kde $[\alpha'] = \epsilon_{k_1}^{(1)}, \dots, \epsilon_{k_n}^{(1)}, \dots$ sa dostane pomocou schém $[\alpha_3]$ a $[\alpha_4]$ hore uvedeným spôsobom. Ukážeme, že $[\alpha'] \neq [\alpha]$. Stačí ukázať, že $[\alpha_3] \neq [\alpha_1]$. Keby bolo $[\alpha_3] = [\alpha_1]$, potom by $S([\alpha_3] \xi_1) = S([\alpha_1] \xi_1) = \frac{1}{2} m + a' = \frac{1}{2} m + a = \frac{1}{2} m + a$, čo je spor.

Čelkom máme teda výsledok: Ku každému $a \in (0,1)$ existuje schéma $[\alpha]$ tak, že $S([\alpha] \xi) = m$ a pre každé dve $a, a' \in (0,1)$, $a \neq a'$ existujú dve rôzne schémy $[\alpha]$, $[\alpha']$ spĺňajúce podmienku:

$$S([\alpha] \xi) = S([\alpha'] \xi) = m. \quad (9)$$

Množina tých $[\alpha]$, pre ktoré platí (9), má teda mohutnosť aspoň takú ako interval $(0,1)$, t. j. aspoň mohutnosť kontinua. Pretože však množina všetkých znamienkových schém má zrejme mohutnosť kontinua, aj množina tých $[\alpha]$, pre ktoré $S([\alpha] \xi) = m$, má mohutnosť práve kontinua. Tým je dôkaz hotový.

Príklad: a) Vieme, že:

$$\log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots$$

t. j. $\log 2 = S([\alpha] \xi)$, kde

$$\xi = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

a $[\alpha] \equiv 1, -1, 1, -1, \dots$

Podľa dokázanej vety množina tých schém $[\alpha]$, pre ktoré $S([\alpha] \xi) = \log 2$ má mohutnosť kontinua. Schéma:

$$[\alpha] \equiv 1, -1, 1, -1, \dots$$

je len jedna z nich.

b) Podobne existuje nespočetne mnoho mohutností kontinua radov $[\alpha] \xi$ takých, že $S([\alpha] \xi) = \frac{\pi}{4}$, kde $\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$. Rad $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots +$

$$+ (-1)^{n+1} \frac{1}{2n-1} + \dots$$

je len jedným z nich.

V ďalšom sa budeme zaoberať vlastnosťami bodovej množiny X_1 vnorenej do priestoru (X, ϱ) .

Definujme na množine X_1 reálnu funkciu $f(x)$ takto:

$$1. \text{ Ak je rad } x \text{ konvergentný, potom kladieme } f(x) = \frac{S(x)}{1 + |S(x)|}, \text{ kde}$$

$S(x)$ je súčet radu x .

2. Ak je rad x divergentný a $S(x) = +\infty$, potom kladieme $f(x) = 1$, ak je rad x divergentný a $S(x) = -\infty$, potom kladíme $f(x) = -1$.

Ďalej na množine X_1 definujeme funkciu $f_n(x)$ pre $n = 1, 2, 3, \dots$ rovnicou:

$$f_n(x) = \frac{S_n(x)}{1 + |S_n(x)|}.$$

Poznámka. $f_n(x)$ je konečná reálna funkcia a $|f_n(x)| < 1$ pre každé $x \in X_1$.
Lemma 2. Pre každé $x \in X_1$ existuje limita postupnosti $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ a platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

Dôkaz: Predovšetkým si uvedomíme, že na základe definície množiny X_1 existuje pre každé $x \in X_1$ limita (vlastná alebo nevlastná) postupnosti $\{S_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$
 a $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$.

Rozoznávajme tri prípady:

a) Nech $-\infty < S(x) < +\infty$.

Postupnosť $\{S_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ má teda vlastnú limitu $S(x)$. Keďže pre každé prirodzené n je $f_n(x) = \frac{S_n(x)}{1 + |S_n(x)|}$, má podľa známych viet o limitách postupností aj podiel vpravo limita rovná $\frac{S(x)}{1 + |S(x)|}$. Teda $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{S(x)}{1 + |S(x)|} = f(x)$.

b) Nech $S(x) = +\infty$.

Podľa definície funkcie $f(x)$ je teda $f(x) = 1$. Máme ukázať, že $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$.

Nech ε je ľubovoľné kladné číslo. Existuje $K > 0$ tak, že $\frac{1}{1+K} < \varepsilon$. Keďže ďalej $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = +\infty$, existuje n_0 tak, že pre všetky $n \geq n_0$ je $S_n(x) > K$. Teda pre všetky $n \geq n_0$ platí:

$$|f_n(x) - 1| = \left| \frac{S_n(x)}{1 + |S_n(x)|} - 1 \right| = \frac{1}{1 + |S_n(x)|} < \frac{1}{1+K} < \varepsilon.$$

c) Nech $S(x) = -\infty$.

Tvrdenie lemy sa v tomto prípade dokáže úplne tak ako v prípade b).

Veta 2: Množina X_1 tých radov $x \in X$, ktoré majú súčet, je množinou prvej kategórie.

Dôsledok. Keďže priestor (X, ρ) je množinou druhej kategórie (je to úplný priestor — pozri [1]), množina X_2 oscilujúcich radov z X je množinou druhej kategórie.

Dôkaz: Predovšetkým ukážeme, že pre každé pevné n prirodzené je funkcia $f_n(x)$ spojitá v (X_1, ρ) . Skutočne, nech $x \in X_1$ a ε je ľubovoľné kladné číslo.

Položme $\delta = \frac{1}{n} > 0$. Pre každé $y \in X_1$, $\rho(x, y) < \delta$ platí: $S_n(y) = S_n(x) = \Rightarrow f_n(y) = f_n(x) \Rightarrow |f_n(y) - f_n(x)| = 0 < \varepsilon$.

Podľa lemy 2 je funkcia $f(x)$ v celom priestore X_1 limitom postupnosti $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$, teda $f(x)$ je funkciou prvej Baireovej triedy v X_1 .

Ukážeme, že funkcia $f(x)$ je nespojitá v celom priestore (X_1, ρ) . Máme teda ukázať, že $f(x)$ je nespojitá v každom bode $x \in X_1$, $x = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \varepsilon_3 a_3 + \dots + \varepsilon_n a_n + \dots$

Rozoznávajme tri prípady:

a) Nech $S(x) = +\infty$.

Podľa definície funkcie $f(x)$ je teda $f(x) = 1$. Nech $\varepsilon \in (0, 2)$. Ukážeme: nech δ je akokoľvek kladné číslo, existuje $y \in X_1$ tak, že $\rho(x, y) < \delta$ a $|f(x) - f(y)| > \varepsilon$.

Skutočne, nech $\delta > 0$. Zvolme prirodzené N tak, aby $\frac{1}{N} \leq \delta$. K radu x zostrojme rad:

$$y = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \varepsilon_3 a_3 + \dots + \varepsilon_N a_N - a_{N+1} - a_{N+2} - \dots - a_{N+k} - \dots$$

Zrejme je: $\rho(x, y) < \frac{1}{N} \Rightarrow \rho(x, y) < \delta$. Vzhľadom na divergenciu radu (1) je

$$S(y) = -\infty \Rightarrow f(y) = -1. \text{ Teda } |f(x) - f(y)| = 2 > \varepsilon.$$

b) Nech $S(x) = -\infty$.

V tomto prípade sa tvrdenie dokáže tak ako v prípade a).

c) Nech $-\infty < S(x) < +\infty$.

Potom pre číslo $f(x) = \frac{S(x)}{1 + |S(x)|}$ platí: $|f(x)| < 1$, teda $|1 - f(x)| > 0$.

Položme $\varepsilon = \frac{|1 - f(x)|}{2} > 0$. Ukážeme, že v každom okolí bodu x existuje bod y tak, že $|f(x) - f(y)| > \varepsilon$. Nech δ je ľubovoľné kladné číslo. Zostrojme

δ -okolie bodu x , t. j. množinu $\Omega(x, \delta)$, $\Omega(x, \delta) = E(y \in X_1, \rho(x, y) < \delta)$.

Nech N je prirodzené číslo také, aby $\frac{1}{N} \leq \delta$. Zostrojme rad:

$$y = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_N a_N + a_{N+1} + a_{N+2} + \dots + a_{N+k} + \dots$$

Zrejme $y \in \Omega(x, \delta)$, keďže $\rho(x, y) \leq \frac{1}{N} < \delta$. Ďalej vzhľadom na divergenciu radu (1)

je $S(y) = +\infty \Rightarrow f(y) = 1$. Teda:

$$|f(y) - f(x)| = |1 - f(x)| > \varepsilon.$$

Podľa známych viet o funkciách prvej Baireovej triedy je množina bodov nespojitosti funkcie prvej triedy v X_1 množinou prvej kategórie v X_1 , teda X_1 je množinou prvej kategórie v X_1 a tým skor prvej kategórie v X .

Veta 3: Množina X_1 je hustá v X .

Dôkaz. Nech $m \in E_1$. Ukážeme, že už množina X_{1m} tých $x \in X_1$, pre ktoré $S(x) = m$, je hustá v X . Máme teda ukázať, že pre uzáver množiny X_{1m} platí: $\overline{X_{1m}} = X$. Nech $x \in X$. Stáť dokázať, že k ľubovoľnému $\varepsilon > 0$ existuje $y \in X_{1m}$ tak, že $\rho(x, y) < \varepsilon$. Nech je $x = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \varepsilon_3 a_3 + \dots + \varepsilon_n a_n + \dots$

Zvolme prirodzené n tak, aby $\frac{1}{n} \leq \varepsilon$. Označme $\varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n = a$.

Zostrojme schému:

$[\alpha'] \equiv \varepsilon'_{n+1}, \varepsilon'_{n+2}, \varepsilon'_{n+3}, \dots, \varepsilon'_{n+k}, \dots$
tak, aby rad

$$\varepsilon'_{n+1} a_{n+1} + \varepsilon'_{n+2} a_{n+2} + \varepsilon'_{n+3} a_{n+3} + \dots + \varepsilon'_{n+k} a_{n+k} + \dots$$

bol konvergentný a aby jeho súčet bol $m - a$. To je zrejme možné na základe Riemannovej vety. Potom rad

$$y = [\alpha] \xi = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n + \varepsilon'_{n+1} a_{n+1} + \dots + \varepsilon'_{n+k} a_{n+k} + \dots$$

je konvergentný, $\varrho(x, y) \leq \frac{1}{n+1} < \varepsilon$ a $S(y) = m$, t. j. $y \in X_m$. Tým je dôkaz hotový.

Došlo 24. IX. 1951.

LITERATÚRA

1. T. Šalát: O súčoch istých konvergentných radov, Matematicko-fyzikálny časopis SAV, 4, r. 1954, str. 122

ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕОРЕМЕ РИМАНА О РАСХОДЯЩИХСЯ РЯДАХ

ТИБОР ШАЛАТ

В ВВОДЕ

Предметом настоящей работы является решение некоторых вопросов, находящихся в связи с теоремой Римана о расходящихся рядах.

Последовательность: $[\alpha] \equiv \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ где $\varepsilon_n = +1$ или -1 назовем синволивической схемой.

Пусть $\xi = \sum_{n=1}^{\infty} a_n > 0$ для каждого $n = 1, 2, 3, \dots$, расходящийся ряд, $a_n \rightarrow 0$.

Знаком $[\alpha] \xi$ обозначим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n a_n$. Если этот ряд сходится, обозначим его сумму $S([\alpha] \xi)$. На основании теоремы Римана в каждому реальному числу m существует схема $[\alpha]$ так, что $S([\alpha] \xi) = m$. В работе доказана теорема, находящаяся в связи с ней: К каждому реальному m существует бесконечно много мощности континуума схем $[\alpha]$ так, что $S([\alpha] \xi) = m$.

Знаком X обозначим множество всех рядов $X = [\alpha] \xi$, где $[\alpha]$ пробегает все возможные схемы. Само собой разумеется, что X является несчетным множеством мощности континуума. Знаком X_1 обозначим множество тех $x \in X$, которые имеют сумму (конечную или бесконечную), знаком X_2 множество тех $x \in X$, которые не имеют суммы. На множестве X определяется метрика ϱ , введенная автором в работе [1]. В настоящей работе доказана теорема: Множество X_1 является множеством первой категории, плотным в X , множество X_2 является множеством другой категории.