

O BIKOMPAKTNÝCH TOTÁLNE NEKOMUTATÍVNYCH POLOGRUPÁCH

FRANTIŠEK KRŇAN, Bratislava

Pologrupu S nazývame topologickejou, ak množina jej prvkov tvorí topologickej priestor a operacia násobenia je v tejto topológi spojité. Ak tento topologickej priestor je bikompaktný a Hausdorffov, hovoríme, že pologrupa je bikompaktná a Hausdorffova. V celej práci sa pojednáva len o topologickej Hausdorffových bikompaktných pologrupách. Kvôli kratšiemu vyjadrovaniu bude hovoriť stručne: pologrupa S , namiesto Hausdorffova bikompaktná pologrupa S .

Zápis $A \subset S$ znamená vždy, že množina A je vlastnou podmnožinou množiny S na rozdiel od zápisu $A \subseteq S$, ktorý pripísťa $A = S$. Symbol \bar{A} znamená uzáver množiny A .

Pre pohodlie čitateľa pripomienieme niekoľko známych poznatkov, ktoré v ďalších úvahách používame. (Podrobnej dôkazy pozri v [4].)

Hovoríme, že prvak $a \in S$ patrí k idempotentu e_a , ak e_a je jediným idempotentom $\bar{A} = \{a, a^2, \dots\}$. Každý prvak $a \in S$ patrí k jednému a len k jednému idempotentu. Síhmi všetkých prvkov $\in S$, ktoré patria k idempotentu e_a , označíme znakom K_a . Platí $S = \bigcup K_a$. Množiny K_a sú disjunktne a každá z nich obsahuje ako podmnožinu istú maximálnu uzavretú grupu G_a , ktorá má e_a za jednotkový prvak; $G_a \subseteq K_a$. Ak $a \in K_a$, $e_a \in K_a$, potom $ae_a = e_a a$. Vo všeobecnom nekomutatívnom prípade množiny K_a nie sú nutne pologrupy. Cieľom práce je ukázať, ako sa výsledky práce [1] prenášajú na Hausdorffove bikompaktné pologrupy.

Najprv pojednáme všeobecne o totálne nekomutatívnych pologrupách. Hausdorffovu bikompaktnú pologrupu S nazveme totálne nekomutatívnu, ak:

1. obsahuje aspoň dva idempotenty,
2. pre každé dva rôzne idempotenty $e_\alpha \neq e_\beta$ je $e_\alpha e_\beta \neq e_\beta e_\alpha$.

Totálne nekomutatívna pologrupa nemá ani nulový ani jednotkový prvak. Súčin idempotentov nemusí byť idempotent. Tak napr. v práci [6] je uvedený na str. 188 príklad konečnej totálne nekomutatívnej pologrupy, v ktorej súčin niektorých idempotentov nie je idempotent. Rovnako ako v práci [1] (pozri lemma 1) sa však dokáže, že ak náhodou $e_\alpha e_\beta = e_\beta$, potom je $e_\beta \cdot e_\alpha = e_\alpha$.

Názov totálne nekomutatívna pologrupa je odôvodnený touto vetou:

Veta 1. *Centrum totálne nekomutatívnej pologrupy S je prázdna množina.*

Dôkaz. Vetu dokážeme nepriamo. Predpokladajme, že centrum Z je neprázdne a že teda existuje taký prvok $c \in Z \subseteq S$, že pre každé $x \in S$ je $xc = cx$. Úplhou indukciou z toho vyplýva, že aj $C = \{c, c^2, \dots\} \subseteq Z$. Dokážeme najprv, že z náslovo predpokladu vyplýva, že aj $\overline{C} \subseteq Z$.

Predpokladajme, že existuje taký prvok $\zeta \in \overline{C}$, ktorý nepadne do Z . Potom existuje taký prvok $x_0 \in S$, že $\zeta x_0 \neq x_0 \zeta$. Vzhľadom na predpoklad, že pologrupa S je Hausdorffova, existujú také okolia $U(\zeta x_0)$, $U(x_0 \zeta)$ prvok ζx_0 , $x_0 \zeta$, že

$$U(\zeta x_0) \cap U(x_0 \zeta) = \emptyset. \quad (1)$$

Zo spojitosťi násobenia vyplýva ďalej existencia takých okoli $U_1(x_0)$, $U_1(\zeta)$, $U_2(x_0)$, $U_2(\zeta)$, že

$$\begin{aligned} U_1(x_0) U_1(\zeta) &\subseteq U(x_0 \zeta), \\ U_2(\zeta) U_2(x_0) &\subseteq U(\zeta x_0). \end{aligned} \quad (2)$$

Nech

$$\begin{aligned} U(x_0) U(\zeta) &\subseteq U(x_0 \zeta), \\ U(\zeta) U(x_0) &\subseteq U(\zeta x_0). \end{aligned} \quad (3)$$

Z (2) a (3) dostávame

$$\begin{aligned} U(x_0) U(\zeta) &\subseteq U_1(x_0) \cap U_2(x_0), \\ U(\zeta) U(x_0) &\subseteq U_1(\zeta) \cap U_2(\zeta). \end{aligned} \quad (4)$$

Pretože $\zeta \in \overline{C}$, obsahuje každé okolie prvku ζ nejaký prvok ležiaci v C . K násľemu okoliu $U(\zeta)$ existuje teda také prirodzené číslo k , že $c^k \in U(\zeta)$. Podľa (4) dostávame:

$$\begin{aligned} x_0 c^k &\in U(x_0) U(\zeta) \subseteq U(x_0 \zeta), \\ c^k x_0 &\in U(\zeta) U(x_0) \subseteq U(\zeta x_0). \end{aligned}$$

Pretože $\zeta \in \overline{C}$, obsahuje každý s každým prvkom ζ nejaký prvok ležiaci v C .

Podľa (4) dostávame: $x_0 c^k \in U(x_0) U(\zeta) \subseteq U(x_0 \zeta)$, $c^k x_0 \in U(\zeta) U(x_0) \subseteq U(\zeta x_0)$.

K násľemu okoliu $U(\zeta)$ existuje teda také prirodzené číslo k , že $c^k \in U(\zeta)$. Pretože prvok c^k je zámenný s každým prvkom $\in S$, máme:

$$x_0 c^k \in U(x_0) U(\zeta) \subseteq U(x_0 \zeta),$$

$$c^k x_0 \in U(\zeta) U(x_0) \subseteq U(\zeta x_0).$$

To je v rozpore s (9). Nás predpoklad je teda nesprávny, a preto $e_a e_{e_r} = e_{e_r} e_a$. Vzhľadom na totálnu nekomutatívnosť pologrupy S vyplýva z tohto vzťahu $e_a = e_{e_r}$, t. j. ab patrí k idempotentu e_a , teda $ab \in K_a$, č. b. t. d.

Veta 3. *Každá množina K_a totálne nekomutatívnej pologrupy S je uzavretá.*

Dôkaz. Je známe (pozri [4], lemma 9), že ak $e_a \in K_a$ a množina K_a nie je uzavretá, potom $\overline{K_a}$ obsahuje aspoň jeden ďalší idempotent $e_b \neq e_a$. Ak $e_b \in \overline{K_a}$, potom (pozri [4] lemma 11) platí $e_a = e_a e_b = e_b e_a$. Keby množina K_a nebola uzavretá, mal by sme spor s predpokladom, že pologrupa S je totálne nekomutatívna. Teda každá množina K_a je uzavretá.

Veta 4. *Každý obojstranný ďidel J totálne nekomutatívnej pologrupy S obsahuje všetky idempotenty $\in S$.*

Dôkaz. Je známe (pozri [5], veta 2), že každá Hausdorffova bikompaktná pologrupa S má jediný minimálny obojstranný ďidel N , ktorý je bikompaktný (v relativnej topológií). Stačí preto, ak dokážeme, že každý idempotent $\in S$ leží v N . Bikompaktná množina N obsahuje aspon jeden idempotent. Označme ho e_a : $e_a \in N$. Ak $N = S$, nemáme čo dokázať. Nech $N \neq S$. Predpokladajme, že existuje aspon jeden idempotent $e \in S - N$. Utvorme súčin $ee_a = p$. Zrejmé platí

$$U(e_a e_r) \cap U(e_r e_a) = \emptyset. \quad (9)$$

Zo spojitosťi násobenia plynie opäť existencia takých okoli $U_1(e_a)$, $U_1(e_r)$, $U_2(e_a)$, $U_2(e_r)$, že

$$U_1(e_a) U_1(e_r) \subseteq U(e_a e_r), \quad (10)$$

$$U_2(e_r) U_2(e_a) \subseteq U(e_r e_a), \quad (11)$$

Nech

$$\begin{aligned} U(e_a) &\subseteq U_1(e_a) \cap U_2(e_a), \\ U(e_r) &\subseteq U_1(e_r) \cap U_2(e_r). \end{aligned} \quad (12)$$

Z (10) a (11) vyplýva:

Pretože e_r leží v uzávare množiny $C = \{(ab), (ab)^2, \dots\}$, obsahuje každé prirodzené číslo s , že $(ab)^s \in U(e_r)$. Podľa (12) máme potom

$$(ab)^s e_a \in U(e_a) U(e_r) \subseteq U(e_a e_r),$$

Avšak $e_a a = ae_a$, $e_a b = be_a$, teda

$$\begin{aligned} e_a (ab)^s &\in U(e_a e_r) \cap U(e_r e_a), \\ s - \text{činitelov} &\quad s - \text{činitelov} \end{aligned}$$

t. j.

$$e_a (ab)^s \in U(e_a e_r) \cap U(e_r e_a).$$

To je v rozpore s (9). Nás predpoklad je teda nesprávny, a preto $e_a e_{e_r} = e_{e_r} e_a$.

Vzhľadom na totálnu nekomutatívnosť pologrupy S vyplýva z tohto vzťahu $e_a = e_{e_r}$, t. j. ab patrí k idempotentu e_a , teda $ab \in K_a$, č. b. t. d.

Veta 2. *Každá množina K_a totálne nekomutatívnej pologrupy S je pologrupa.*

Dôkaz. Nech $a \in K_a$, $b \in K_a$. Máme dokázať, že $ab \in K_a$. Predpokladajme, že ab patrí k idempotentu e_r , t. j. e_r je jediný idempotent ležiaci v množine $\overline{C} = \{(ab), (ab)^2, \dots\}$. Utvorme súčin $e_a e_r$, $e_r e_a$ a predpokladajme, že $e_a e_r \neq e_r e_a$. Potom existujú také okolia prvkov $e_a e_r$, $e_r e_a$, že

Teda je

$$P = \{p, p^2, p^3, \dots\} \subseteq N \quad \text{a} \quad \bar{P} \subseteq \bar{N} = N.$$

Možina \bar{P} obsahuje jediný idempotent, označme ho e_{β} . Tvrďme $ee_{\beta} = e_{\beta}$. Dokážeme to nepriamo. Keby platilo $ee_{\beta} \neq e_{\beta}$, existovali by disjunktne okolia prvkov ee_{β} , e_{β} , t. j.

$$U(ee_{\beta}) \cap U_1(e_{\beta}) = \emptyset.$$

Zo spojitosi násobenia plynne existencia takých okoli $U(e)$, $U_2(e_{\beta})$, že

Ak

$$U(e) U_2(e_{\beta}) \subseteq U(ee_{\beta}).$$

potom tým skôr je

$$U(e) U(e_{\beta}) \cap U(e_{\beta}) = \emptyset. \quad (\text{b})$$

Avšak $e_{\beta} \in \bar{P}$, preto existuje také prirodzené číslo k , že $p^k = (ee_a)^k \in U(e_{\beta})$. Zrejme je $e(ee_a)^k \in U(e) U(e_{\beta})$. Avšak $e(ee_a)^k = (ee_a)^k$, teda

$$(ee_a)^k \in U(e) U(e_{\beta}) \cap U(e_{\beta}).$$

To je v rozpore so vzťahom (b). Preto je $ee_{\beta} = e_{\beta}$. Z rovnice $ee_{\beta} = e_{\beta}$ vypĺýva (pozri [1], lemma 1), že

$$e = e_{\beta}e \in NS \subseteq N.$$

To je spor s predpokladom $e \in S - N$. Tým je dokázané, že množina $S - N$ neobsahuje žiadny idempotent. Teda N obsahuje množinu E všetkých idempotentov pologrupy S , č. b. t. d.

Veta 5. *Zjednotenie všetkých maximálnych grup totálne nekomutatívnej pologrupy S je N .*

Maximálne grupy sú narzádjom izomorfne.

Dôkaz. Je známe (pozri [5] veta 4L a 4R), že pre každý idempotent $e \in N$ je N_e (resp. eN) minimálny lavý (resp. pravý) ideál z S . Ďalej je známe, že v pologrupe, ktorá má aspoň jeden minimálny lavý a aspoň jeden minimálny pravý ideál, existuje minimálny obojstranný ideál N a tento je zjednotením disjunktívnych izomorfífsch uzavretých grup. Ak S je totálne nekomutatívna pologrupa, leží podľa vety 4 každý jej idempotent v ideále N . V dôsledku toho platí pre každú maximálnu grupu G_a vztah $G_a \subseteq N$. Pretože S nemá žiadne iné maximálne grupy, je zjednotenie všetkých maximálnych grup (v totálne nekomutatívnej pologrupe) množina N a všetky tiež grupy sú izomorfne.

Tým je veta 5 dokazaná.

Následujúce príklady slúžia na ilustráciu odvodených vied.

Priklad 1. Nех S je pologrupa komplexných čísel $z = e^{ip}$, pre ktoré $0 < r \leq |z| \leq 1$. Topológia nech je obyčajná topológiá v komplexnej rovine. Násobenie nech je definované takto: $z_1 \circ z_2 = e_1 e^{ip_1} \circ e_2 e^{ip_2} = e_1 e^{i(p_1 + p_2)}$. To je totálne nekomutatívna pologrupa. (Pritom je táto pologrupa zrejme neperio-

dická.) Idempotentmi sú všetky reálne čísla $\varrho \in \langle r, 1 \rangle$. Pre každý idempotent $\varrho \in N$ je $L = Ne = N = S$ (pozri [5], veta 2). Pre každý idempotent $\varrho \in N$ je $L = Ne = N = S$, t. j. jediný minimálny lavý ideál pologrupy S je celá pologrupa. Minimálne pravé idempotenty pologrupy S sú množiny $R_{\varrho} = eN = \{z \mid |z| = \varrho\}$. Teda je $R_{\varrho} = K_{\varrho} = G_{\varrho}$. Maximálne grupy G_{ϱ} sú vzhľomne izomorfne. (Poznamenanávam, že predpoklad $r > 0$ je nutný, aby násobenie bolo asociatívne, teda aby S bola pologrupa.)

Priklad 2. Nех S je pologrupa komplexných čísel z , pre ktoré $\frac{1}{4} \leq |z| \leq 1$. Topológia nech je obyčajná topológiá v komplexnej rovine. • Násobenie nech je definované takto: $z_1 \circ z_2 = e^{ip_1} \odot e^{ip_2} = \min(\varrho_1, \frac{1}{2})e^{i(p_1 + p_2)}$. To je totálne nekomutatívna (nepériodická) pologrupa. Idempotentmi sú reálne čísla $\varrho \in \langle \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \rangle$. Pre každý idempotent ϱ je $S_{\varrho}S = \{z \mid \frac{1}{4} \leq |z| \leq \varrho \leq \frac{1}{2}\} = N$. Pre každý idempotent ϱ je $L = Ne = N \neq S$, t. j. N je jediný minimálny lavý ideál pologrupy S . Keďže $R_{\varrho} = eN = \{z \mid |z| = \varrho\}$, $R_{\varrho} = K_{\varrho} = G_{\varrho}$; pre $\varrho = \frac{1}{2}$ je $R_{\frac{1}{2}} = G_{\frac{1}{2}} = \{z \mid |z| = \frac{1}{2}\} \neq K_{\frac{1}{2}} = \{z \mid \frac{1}{2} \leq |z| \leq 1\}$. Platí $N = \cup G_{\varrho}$. Maximálne grupy G_{ϱ} sú vzhľomne izomorfne. (Vzhľomne si vyslovne, že S je totálne nekomutatívna pologrupa, v ktorej $N \neq S$.)

Príklad 3. Nех príklami pologrupy S sú dvojice reálnych čísel (x, y) ; $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$; $0 \leq y \leq 1$. Topológia nech je obyčajná topológiá v rovine. Násobenie nech je definované takto: $(x_1, y_1) \circ (x_2, y_2) = x_1 x_2, y_2$. Toto je totálne nekomutatívna pologrupa. Množina idempotentov je $E = \{(0, y); 0 \leq y \leq 1\}$. Pre každý idempotent $e_y = (0, y)$ je $S_{e_y}S = E$, preto $N = \cap S_{e_y}S = E$. Pre každý idempotent e_y je $R_y = e_y N = (0, y)E = E = N$, t. j. jediný minimálny pravý ideál pologrupy S je $N = E$. Minimálne lavé ideály pologrupy S sú množiny $L_y = N(0, y) = E(0, y) = \{(0, y)\} = \{e_y\} = G_y$. Platí $N = \cup G_y$; to je disjunktne zjednotenie jednoprvkových maximálnych grup.

Teraz dokážeme dve vety o maximálnych obojstranných ideáloch, ktoré nám umožnia dokázať vety 8 a 9. Tieto vety podrobnejšie objasňujú štruktúru totálne nekomutatívnych pologrup.

Obojstranný ideál J sa nazýva maximálny, ak neexistuje obojstranný ideál J' splňujúci vztah $J \subset J' \subset S$.

Známy je tento výsledok (pozri [3], veta 1): Každý vlastný obojstranný ideál bikompaktnej pologrupy S je obsadený v nejakom maximálnom vlastnom obojstrannom ideáli. Každý vlastný obojstranný maximálny ideál je otvorený.

Dokážeme najprv túto vetu:

Veta 6. *Nech S je totálne nekomutatívna bikompaktna pologrupa. Pre každý jej maximálny obojstranný ideál J platí $S^2 \subseteq J$.*

Dôkaz. V práci [3] je dokázaná táto veta: Ak S je bikompaktna polo-

grupa a množina jej idempotentov je obsažená v nejakom jej obojstrannom vlastnom ideáli J , potom $S^2 \subseteq J$. V prípade totálne nekomutatívnej pologrupy je $E \subseteq N$ (veta 4). Teda množina E je tým skôr obsažená v každom obojstrannom maximálnom ideáli J a v dôsledku toho je správne tvrdenie vety 6. (Pozri analogický výsledok v [1], lemma 2.)

Veta 7. *Nech v totálne nekomutatívnej pologrupe S je $S - S^2 \neq \emptyset$; potom každý jej maximálny obojstranný ideál má tvar $J_a = S - \{a\}$, kde $a \in S - S^2$.*

Dôkaz. Nech A je lubovoľná množina obsažená v $S - S^2$.

Plati:

$$S(S^2 \cup A) = S^3 \cup SA \subseteq S^2 \cup S^2 \subseteq S^2 \cup A,$$

$$(S^2 \cup A)S = S^3 \cup AS \subseteq S^2 \cup S^2 \subseteq S^2 \cup A.$$

Teda $S^2 \cup A$ je obojstranný ideál pologrupy S . Ak ku množine S^2 pridáme všetky prvky množiny $S - S^2$ okrem jedného prvku, dostávame zrejme maximálny ideál $z S$. Keďže v totálne nekomutatívnej pologrupe leží (podľa vety 6) S^2 v každom maximálnom obojstrannom ideáli, dostávame takto v prípade totálne nekomutatívnej pologrupy, všetky maximálne obojstranné ideály $z S$.

Dôsledok vety 7. *Ak v totálne nekomutatívnej pologrupe je $S - S^2 \neq \emptyset$, potom prenič všetkých maximálnych obojstranných ideálov pologrupy S je S^2 .*

Veta 8. *Nech S je totálne nekomutatívna pologrupa. Potom $S = S^2$ vtedy a len vtedy, ak $S = N$ (t. j. ak S je jednoduchá pologrupa).*

Dôkaz. 1. Ak $N = S$, zo vzťahu $S^2 \subseteq S$ by vyplývalo $S^2 \subseteq N$. To však nie je možné, lebo podľa definície leží N v každom obojstrannom ideáli $z S$ (spečiálne $N \subseteq S^2$). Teda $S^2 = S$.

2. Ak $N \subset S$, obsahuje S nejaký maximálny obojstranný ideál J . Pritom je $N \subseteq J \subset S$. Podľa vety 6 je $S^2 \subseteq J$ a teda $S^2 \subseteq S$, t. j. $S^2 \neq S$. Tým je veta 8 úplne dokazaná.

Veta 9. *Nech S je totálne nekomutatívna pologrupa, N jej minimálny obojstranný ideál, potom $N = \bigcap_{n=1}^{\infty} S^n$.*

Dôkaz. Utvorme nerastúcu postupnosť obojstranných ideálov:

$$S \supseteq S^2 \supseteq S^3 \supseteq \dots$$

Každý z týchto ideálov obsahuje (podľa vety 4) množinu E všetkých idempotentov pologrupy S . Teda je $\emptyset \neq E \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} S^n$. Označme $T = \bigcap_{n=1}^{\infty} S^n$. T je neprázdný uzavretý obojstranný ideál pologrupy S (lebo S^n sú uzavreté obojstranné ideály). Teda je T v relatívnej topológií bikompaktná (totálne nekomutatívna) pologrupa a platí $N \subseteq T \subseteq S$. Je známe (pozri [7], veta 1), že v každej bikompaknej pologrupe je $T^2 = T$. Keďže $T = T^2$, je podľa vety 8 v našom prípade T jednoduchá pologrupa, ktorá neobsahuje žiadny vlastný obojstranný pod-

ideál $z T$. Avšak obojstranný ideál N pologrupy S je tým skôr obojstranný ideál pologrupy T . Zo vzťahu $N \subseteq T$ vyplýva teda nevyhnutne $N = T$ t. j. $N = \bigcap_{n=1}^{\infty} S^n$, č. b. t. d.

Poznámka. Význam vety 9 možno si dobre ozrejmíť na príkladoch 1–3. V príklade 1 je $S^2 = S$. V príklade 2 je $N = S^2$. V príklade 3 je $S^n \neq S^{n+1}$ pre každé prirodzené číslo n a $E = N = \bigcap_{n=1}^{\infty} S^n$.

LITERATÚRA

- [1] Schwarz Š., Krajkáková D., O totálne nekomutatívnych pologrupach, Mat.-fyz. časopis SAV 9, (1959), 00.
 - [2] Schwarz Š., K teorii periodičeskich polugrupp (rusky), Československij mat. žurnal 3 (78), (1953), 7–21.
 - [3] Koch B. J., Wallace A. D., Maximal ideals in compact semigroups, Duke Math. Journal 21 (1954), 681–686.
 - [4] Schwarz Š., K teorii bikompaktnych polugrupp (rusky), Československij mat. žurnal 5 (80), (1955), 1–23.
 - [5] Numakura K., On bicompact semigroups, Math. Journal of Okayama Univ. I (1952), 99–109.
 - [6] Ivan J., O rozklade jednoduchých pologrup na direktný súčin, Mat.-fyz. časopis SAV 4 (1954), 181–201.
 - [7] Los J., Schwarz Š., Remarks on compact semigroups, Colloquium Mathematicum VI (1959), 265–270.
- Došlo dňa 20. 12. 1958.

Katedra matematiky
Slovenskej vyskej školy technickej
• Bratislave

О ВПОЛНЕ НЕКОММУТАТИВНЫХ
БИКОМПАКТНЫХ ПОЛУГРУППАХ

ФРАНТИШЕК КРНЯН

Выводы

- Хаусдорффову бикомпактную полугруппу S называем вполне некоммутативной, если: 1. Она содержит по крайней мере два идеалогента, 2. для двух любых идеалогентов $e_a \neq e_b$ имеет место $e_a e_b \neq e_b e_a$. Целью этой работы является исследование структуры таких полугрупп.
- В работе доказываются следующие теоремы:
- Центром такой полугруппы является пустое множество.
 - Множество всех элементов, принадлежащих к фиксированному идеалогенту e_a (в смысле работы [4]) замкнутое полугруппа.
 - Минимальный двусторонний идеал N полугруппы S содержит все идеалогенты полугруппы S . Множество N является соединением всех (непересекающихся) максимальных групп полугруппы S . (Все эти группы изоморфные топологические группы).
 - Имеет место равенство $N = \prod_{n=1}^{\infty} S^n$, в частности $S = S^2$ тогда и только тогда если S является простой полугруппой без пули.
 - Если $S - S^2 \neq \emptyset$, то для любого двустороннего идеала J имеет место соотношение $S^2 \subseteq J$, в частности каждый максимальный двусторонний идеал имеет вид $J_a = S - \{a\}$ где $a \in S - S^2$.

ON TOTALLY NON-COMMUTATIVE
BICOMPACT SEMIGROUPS

FRANTIŠEK KRŇAN

Summary

A Hausdorff bicomplete semigroup S is called totally non-commutative if: 1. it has at least two idempotents, 2. for every couple of idempotents $e_a \neq e_b$ we have $e_a e_b \neq e_b e_a$. The purpose of this paper is to study the structure of such semigroups. The following theorems are proved:

- The center of S is empty.
- The set of all elements belonging to a fixed chosen idempotent (in the sense of the paper [4]) is a closed semigroup.
- The minimal two-sided ideal N of S contains all idempotents $\in S$. Hence the set N is a class sum of mutually disjoint maximal groups, which are therefore isomorphic together.
- We have $N = \bigcap_{n=1}^{\infty} S^n$; especially $S = S^2$ holds if and only if S is a simple semigroup (without zero).
- If $S - S^2 \neq \emptyset$, then for every two-sided ideal J we have $S^2 \subseteq J$ and every maximal two-sided ideal of S is of the form $J_a = S - \{a\}$; $a \in S - S^2$.