

ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ОДНОЙ КОМБИНАТОРНОЙ ЗАДАЧЕ

АЛЕКСАНДЕР РОСА (ALEXANDER ROSA), ШТЕФАН ЗНАМ (ŠTEFAN ZNAM),
Братислава

Пусть k — натуральное число; пусть задано натуральное число n такое, что $n \equiv k \pmod{2k}$; обозначим $m = 2n + \frac{n}{k}$. Обозначим

$$M = \{1, 2, \dots, m-1\} - \left\{ 2k+1, 2(2k+1), \dots, \left(\frac{n}{k}-1\right)(2k+1) \right\};$$

очевидно, M содержит $2n$ элементов. Если $i \in M$, то, очевидно, также $m-i \in M$.

Определение. Множество $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\} \subset M$, $N \leq n$, будем называть *множеством типа (k)* , если выполнены условия

$$(1) \quad \sum_{i=1}^N a_i \equiv 0 \pmod{m},$$

$$(2) \quad a_i + a_j \not\equiv 0 \pmod{m} \text{ для всех } i, j = 1, 2, \dots, N.$$

Повторением рассуждений работы [1] можно легко показать, что остаются справедливыми утверждения (а), (б), (в), лемма и теорема из [1], которая примет следующий вид:

Теорема. Пусть $W(n, k, A) = \sum_{i=8}^{n-8} q_i^{(A)}$, где $q_i^{(A)}$ обозначает число разниц подмножеств типа (k) с i элементами множества A типа (k) с n элементами. Тогда $W(n, k, A)$ зависит только от n и k и не зависит от выбранного множества A типа (k) с n элементами.

Выведем теперь формулу для определения числа равных множеств типа (k) с n элементами. Обозначим это число через $Q(n, k)$.

Обозначим через $R_n(s, k)$ количество разбиений числа n на отличные друг от друга числа, не превосходящие s и не являющиеся кратным $(2k+1)$. Легко доказать, что для $R_n(s, k)$ имеет место рекуррентная формула:

$$r_r(s, k) = \begin{cases} r_r(s-1, k), & \text{если } s \text{ является кратным } (2k+1), \\ r_r(s-1, k) + r_{r-s}(s-1, k), & \text{если } s \text{ не является кратным } (2k+1). \end{cases}$$

При этом полагаем $r_0(s, k) \stackrel{\text{def}}{=} 1$; $r_r(s, k) \stackrel{\text{def}}{=} 0$ для $r < 0$.

В самом деле, если s — кратное $(2k+1)$, то количество разбиений числа r на отличные друг от друга числа, не превосходящие s и не являющиеся кратными $(2k+1)$, равно количеству разбиений числа r на отличные друг от друга числа, не превосходящие $(s-1)$ и не являющиеся кратными $(2k+1)$.

Если s не является кратным $(2k+1)$, то все разбиения r на отличные друг от друга числа, не превосходящие s и не являющиеся кратными $(2k+1)$, можно разбить на два класса. В первый класс включим разбиения, не содержащие число s ; очевидно, их число равно $r_r(s-1, k)$. Во второй класс включим разбиения, содержащие число s . Этих разбиений столько же, сколько имеется разбиений числа $r-s$ на отличные друг от друга числа, не превосходящие $s-1$ и не являющиеся кратными $(2k+1)$; их число равно, очевидно, $r_{r-s}(s-1, k)$.

Возьмем произвольное множество $A \subset M$. Сумму всех $a_i \in A$, не превосходящих числа $n + \frac{n-k}{2k}$, обозначим через α ; для $a_i > n + \frac{n-k}{2k}$ обозначим $b_i = m - a_i$ (очевидно, $b_i \leq n + \frac{n-k}{2k}$); сумму всех b_i обозначим через β .

Если A — множество типа (k) , то, очевидно, $\alpha \equiv \beta \pmod{m}$. Числа a_i и b_i пробегают все числа $1, 2, \dots, n + \frac{n-k}{2k}$ за исключением кратных $(2k+1)$ (см. (B) в [1]), значит,

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \frac{1}{2} \left(n + \frac{n-k}{2k} \right) \left(n + \frac{n+k}{2k} \right) - \frac{1}{2} \frac{n-k}{2k} \cdot \frac{n+k}{2k} (2k+1) = \\ &= \frac{1}{4k} (2kn^2 + n^2 + k^2). \end{aligned}$$

Если A — множество типа (k) , то α должно удовлетворять соотношению

$$(3) \quad 2\alpha \equiv \frac{1}{4k} (2kn^2 + n^2 + k^2) \pmod{m},$$

$$(4) \quad 0 \leq \alpha \leq \frac{1}{4k} (2kn^2 + n^2 + k^2).$$

Легко показать и обратное:

Пусть $A \subset M$, пусть элементы из A удовлетворяют (2) и пусть α удовлетворяет (3) и (4). Тогда A есть множество типа (k) .

Пусть некоторое число α удовлетворяет (3) и (4). Пусть $\alpha = x_1 + x_2 + \dots + x_t$, $t \leq n$, — некоторое разбиение числа α на отличные друг от друга числа, не превосходящие $n + \frac{n-k}{2k}$ и не являющиеся кратными $(2k+1)$. Всякому такому разбиению можно поставить в соответствие множество типа (k) с n элементами. Двум разным α или двум разным разбиениям одного и того же α при этом поставлены в соответствие разные множества. Таким образом, для $Q(n, k)$ получаем формулу

$$Q(n, k) = \sum p_\alpha \left(n + \frac{n-k}{2k}, k \right),$$

где α пробегает все решения сравнения (3), удовлетворяющие неравенству (4).

Аналогично тому, как это сделано в [1], раздел IV, можно показать, что $Q(n, k) = W(n, k) + 2$.

В таблицах 1, 2, 3 приводятся несколько значений $W(n, k)$ для $k = 1, 2, 3$. Примечание. К исследованию множеств типа (k) привела задача из теории графов, состоящая в определении пикнического разложения полного графа $\langle 2kn + n \rangle$ на окружности с n ребрами (см. [2]).

Таблица 1
 $k = 1$

n	3	5	7	9	11
$Q(n, 1)$	0	2	6	18	62
$W(n, 1)$	0	0	4	16	60

Таблица 2
 $k = 2$

n	2	6	10	14	18
$Q(n, 2)$	0	4	40	468	5 828
$W(n, 2)$	0	2	38	466	5 826

n	3	9	15	21	27
$Q(n, 3)$	2	26	938	42 800	2 130 458
$W(n, 3)$	0	24	936	42 798	2 130 456

ЛИТЕРАТУРА

[1] Роса А., Знак Ш., Об одной комбинаторной задаче из теории графов, *Мат. фяз. часоп.* 15 (1965), 49—59.
 [2] Роса А., О циклических разложениях полного графа на непересекающиеся, *Часоп. пэстов. мат.* 91 (1966) (v таáí).
 Поступило 29. 12. 1964.

ČSAV, Kabinet matematiky
 Slovenskej akademie vied, Bratislava
 Katedra matematiky Chemicko-technologickéj fakulty
 Slovenskej vysokej školy technickej, Bratislava

REMARK ON A COMBINATORIAL PROBLEM

Alexander Rosa, Štefan Znám

Summary

Let n, k be natural numbers such that $n \equiv k \pmod{2k}$. Denote $m = 2n + n/k$ and denote

$$M = \{1, 2, \dots, m - 1\} - \left\{ 2k + 1, 2(2k + 1), \dots, \left(\frac{n}{k} - 1 \right) (2k + 1) \right\}.$$

The set $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\} \subset M$, $N \leq n$, is said to be of the type (k) , if (1) holds and if (2) holds for all $i, j = 1, \dots, N$.

If the set A with n elements is of the type (k) , then $q^{(A)}$ denotes the number of its subsets of the type (k) with i elements. The following theorem is valid:

The sum $\sum_{i=1}^n q^{(A)}$ does not depend on the choice of the set A , but only on the number of its elements n and on k (this sum is denoted by $W(n, k)$).

Further the formula for determining $Q(n, k)$, the number of different sets of the type (k) with n elements, is given.

It can be shown by the method analogous to one used in [1], that the following relation holds:

$$Q(n, k) = W(n, k) + 2.$$

n	3	9	15	21	27
$Q(n, 3)$	2	26	938	42 800	2 130 458
$W(n, 3)$	0	24	936	42 798	2 130 456

ЛИТЕРАТУРА

[1] Роса А., Знак Ш., *Об одной комбинаторной задаче из теории сравнений*, *Мат.-физ. časop. 15* (1965), 49—59.
 [2] Роса А., *О циклических разложениях completely графа на пермультониты*, *Časop. pěstov. mat. 91* (1966) (v tlači).
 Поступило 29. 12. 1964.

ČSAV, Kabinet matematiky
 Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 Katedra matematiky Chemicko-technologickej fakulty
 Slovenskej vysokej školy technickej, Bratislava

REMARK ON A COMBINATORIAL PROBLEM

Alexander Rosa, Štefan Znám

Summary

Let n, k be natural numbers such that $n \equiv k \pmod{2k}$. Denote $m = 2n + n/k$ and denote

$$M = \{1, 2, \dots, m-1\} - \left\{ 2k + 1, 2(2k + 1), \dots, \left(\frac{n}{k} - 1\right)(2k + 1) \right\}.$$

The set $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\} \subset M$, $N \leq n$, is said to be of the type (k) , if (1) holds and if (2) holds for all $i, j = 1, \dots, N$.

If the set A with n elements is of the type (k) , then $q^{(A)}$ denotes the number of its subsets of the type (k) with i elements. The following theorem is valid:

The sum $\sum_{i=1}^n q^{(A)}$ does not depend on the choice of the set A , but only on the number of its elements n and on k (this sum is denoted by $W(n, k)$).

Further the formula for determining $Q(n, k)$, the number of different sets of the type (k) with n elements, is given.

It can be shown by the method analogous to one used in [1], that the following relation holds:

$$Q(n, k) = W(n, k) + 2.$$